

截至3月25日已接种新冠疫苗34.6万剂次

石家庄新冠疫苗接种政策明白看

本报讯(燕都融媒体记者檀亚楠)日前,石家庄市疾病预防控制中心发布《新冠病毒疫苗接种倡议书》和《石家庄市新冠病毒疫苗接种明白纸》,就市民关心的新冠病毒疫苗接种问题答疑解惑。

疫苗有效性安全性
有充分保障

倡议书中提到,接种新冠病毒疫苗是防控新冠肺炎最有效的措施之一,目前我国使用的新冠病毒灭活疫苗抗体阳转率达到90%以上,保护率达到70%以上,特别是对中、重症的保护率达到将近100%,疫苗的保护效果非常好。截止到3月25日,石家庄市已接种新冠病毒疫苗34.6万剂次,未报告严重不良反应。目前,全球很多国家也在使用中国疫苗,有效性和安全性有充分保障。

实行全民免费接种新冠病毒疫苗是党中央、国务院作出的重大决策部署,关系人民群众生命安全和健康,通过接种疫苗获得免疫力,不仅能保护接种对象个人,而且对保护家人、同事和社会安全都有重要意义。目前石家庄市已开始为18岁以上居民免费接种新冠病毒疫苗,按照“知情自愿、应接尽接”原则,倡议每个人积极接种新冠疫苗,为保护自身和公众健康作出贡献。

所有符合条件者
均可接种

接种明白纸中提到,按照知情同意、自愿接种的原则,所有符合接种条件,身体健康状况适宜的人员均可到指定接种单位接种新冠病毒疫苗。接种对象年龄为18周岁以上的新型冠状病毒易感者。

接种人员应携带居民身份证,佩戴口罩。接种前如实提供本人身体状况,以便排查是否适宜接种,遵守接种流程,接种完成后留观30分钟方可离开,留观过程中如有不适请及时告知接种医生。

有下列情况严禁使用本疫苗:1.对本品所含任何成分(包括辅料)过敏者;既往发生过疫苗严重过敏反应者。2.未控制的癫痫和患其他进行性神经系统疾病者。3.发热、急性疾病期患者及慢性疾病急性发作期,可暂缓接种。

有下列情况慎重使用本疫苗:1.患有血小板减少症或者出血性疾病患者,肌肉注射本疫苗可能会引起出血;2.正在接受免疫抑制剂治疗或者免疫功能缺陷的患者,接种本疫苗后产生的免疫反应可能会减弱。接种应推迟至治疗结束后或确保其得到了很好的保护。对慢性免疫功能缺陷的患者,即使基础疾病可能会导致有限的免疫反应,也应推荐接种疫苗。

接种后,如出现身体不适及时向接种单位报告,必要时及时到医疗机构就诊。



居民接种新冠疫苗。新华社发



医务人员为居民接种新冠疫苗。新华社发

释疑

新冠疫苗接种,你想问的这儿都有

疫苗接种人群包括哪些?

根据疫情防控的轻重缓急、疫苗供应等情况,石家庄市疫苗接种顺序按以下原则把握:对重点地区、重点单位、重点行业等感染风险高、疾病传播风险高的人群优先接种,有效降低规模性输入和反弹风险;在完成重点人群接种的基础上,根据新冠病毒疫苗临床试验进展和国家安排部署,为老年人(指60岁及以上人群,下同)、基础性疾病患者等人群接种疫苗,降低感染率、重症率和病死率;在此基础上,视情况扩大到其他人群,争取逐步建立人群免疫屏障。

接种疫苗都有哪些禁忌?

对疫苗任何一种成分过敏者,或以前接种本疫苗出现过敏者;慢性疾病急性发作期;发热或急性疾病期患者,应推迟接种本疫苗。下列情况应慎重使用:患有血小板减少症或出血性疾病患者,肌肉注射本疫苗可能会引起出血;正在接受免疫抑制剂治疗或免疫功能缺陷的患者,接种本疫苗后产生的免疫反应可能会减弱;未控制的癫痫、家族和个人有惊厥史者、患其他进行性神经系统疾病者等。

女性月经期可以接种吗?

女性月经期可以接种。

有过敏性鼻炎可以接种吗?

新冠病毒疫苗说明书中的禁忌包括:既往发生过疫苗严重过敏反应(如急性过敏反应、荨麻疹、皮肤湿疹、呼吸困难、血管神经性水肿、腹痛)不得接种。因此要考虑过敏体质的严重程度,并按临床医师的医嘱执行。

痛风发作期可以接种吗?

新冠病毒疫苗说明书中禁忌包括所有严重急性疾病和慢性病的急性发作期,因此痛风发作期不宜接种疫苗。

患有高血压可以接种吗?

新冠病毒疫苗说明书中的禁忌包括:严重的肝肾疾病、药物不可控制的高血压(收缩压 ≥ 140 mmHg,舒张压 ≥ 90 mmHg)、糖尿病并发症、恶性肿瘤不得接种新冠病毒疫苗。但患有高血压,在药物维持血压正常情况下,原则上可以接种新冠病毒疫苗,具体请按临床医师医嘱执行。

糖尿病人可以接种吗?

新冠病毒疫苗说明书中要求患有严重的肝肾疾病、药物不可控制的高血压(收缩压 ≥ 140 mmHg,舒张压 ≥ 90 mmHg)、糖尿病并发症、恶性肿瘤不得接种新冠病毒疫苗。但没有并发症的糖尿病患者不属于禁忌范围,请按临床医师医嘱执行。

有心脏病和冠心病,冠状动脉粥样硬化的人能接种吗?

疫苗说明书禁忌症中包括:发热、各种急性疾病、慢性疾病急性发作期,暂缓接种。因此心脏病和冠心病,冠状动脉粥样硬化如果处于急性发作期应暂缓接种疫苗。患有慢性疾病,在药物控制良好的情况下,原则上可以接种疫苗,请参考临床医师医嘱执行。

如何发现,把握接种禁忌?

在操作实施过程中,如果接种第一剂次疫苗出现严重过敏反应,且不能排除是疫苗引起的,则不建议接种第二剂次。接种时,接种医生应仔细询问受种者的健康状况及既往过敏史。受种者要如实向接种医生报告身体健康状况及疾病史、过敏史等。

什么叫疫苗不良反应?

疫苗不良反应指因疫苗本身特性引起的与预防接种目的无关或者意外的反应,与受种者个体差异有关。疫苗不良反应包括一般反应和异常反应。一般反应主要指受种者发生的一过性、轻微的机体反应,如接种部位红肿、硬结、疼痛等局部反应,发烧、乏力、头痛等全身反应。异常反应主要指造成受种者的器官或功能损害的相关反应,罕见发生,如急性严重过敏反应等。

什么是心因性反应?

心因性反应指在接种疫苗后,因受种者心理因素发生的反应,主要是接种疫苗时的心理压力、焦虑等所致,无器质性损害,与疫苗无关。有的是“晕针”样表现,有的是“癔症”样表现。群体性预防接种活动中可出现群体心因性反应。

偶合反应是怎么回事?

偶合症(偶合反应)是指疫苗接种过程中,受种者正好处在一个疾病的潜伏期或者发病的前期,疫苗接种后巧合发病。因此,偶合症(偶合反应)不是疫苗接种引起的,与疫苗无关,也不属于接种后的不良反应。疫苗接种后的偶合症有时不能立即做出判断,需要及时报告,也需要疾控等机构进行调查、调查诊断专家组做出诊断。

可以和其他疫苗一起打吗?

不建议与其他疫苗同时接种。目前国内所有新冠病毒疫苗均为灭活疫苗,相对来说安全性也较好。不过,对于新冠病毒疫苗这个疫苗家族新成员,我们建议在接种时间上最好能与其他疫苗分开,相隔至少两周以上,尽量减少非预期的相互影响,同时也需要密切观察接种后的反应。

去哪儿接种疫苗?

疫苗接种地点为预防接种门诊或临时接种点,包括辖区卫生服务中心、乡镇卫生院、

二级以上综合医院,可到就近接种点接种。

新冠病毒疫苗打几针?

推荐免疫程序为2针,间隔21天至56天,接种部位为上臂三角肌。随意调整免疫程序可能影响安全性、免疫应答效果和免疫持久性。新冠病毒疫苗接种的时间间隔请严格按照疫苗说明书执行。接种第一剂疫苗后,接种单位有责任告知受种者第二针的接种时间。请按接种单位预约时间进行第二剂疫苗接种。

接种过程中需要注意什么?

接种新冠病毒疫苗需携带相关证件(身份证、护照等),并根据当地防控要求,做好个人防护,配合现场预防接种工作人员询问,如实提供本人健康状况和接种禁忌等信息。接种后需留观30分钟;保持接种局部皮肤的清洁,避免用手搔抓接种部位;如发生疑似不良反应,报告接种单位,需要时及时就医。

接种后为何要留观30分钟?

接种疫苗后,可能有极少数人会出现急性过敏反应、晕厥等情况。严重危及生命安全的急性过敏反应多在接种后30分钟内发生。如发生急性过敏反应,可以在现场及时采取救治措施。晕厥也大多出现在接种后30分钟内,如接种后立即离开留观现场,可能会因晕厥给受种者造成意外伤害。因此,受种者在接种疫苗后需要在接种单位指定区域留观30分钟。

曾经感染过是否还需要接种?

对于多数传染病,在感染病原体后,人体都会产生一定的免疫力,这部分人群通常不属于疫苗接种对象。对于接种前已知的新冠肺炎确诊病例、无症状感染者,目前暂不建议接种新冠病毒疫苗;对于没有明确感染新冠病毒或患过新冠肺炎,符合接种条件者均可接种疫苗。

是否需要每年接种?

通常情况下,病原体、疫苗特性、受种者状况等因素都会影响疫苗的预防接种效果。流感病毒变异比较快,流感疫苗保护效果较短,因此需要每年进行接种。现在新冠病毒虽然也发生了一定程度的变异,但根据世界卫生组织网站目前发布的信息,显示针对在英国和南非等国家出现的新冠病毒所发生的变异,没有证据表明现有的新冠病毒疫苗失效。新冠病毒疫苗是否会像流感疫苗一样每年接种,需要继续针对病毒变异对疫苗接种效果的影响和疫苗的保护持久性等方面开展研究。

接种后还需做核酸检测吗?

接种疫苗可以在一定程度上降低感染风险,但任何疫苗的保护效果都不能达到100%,必要时仍应配合相关部门进行核酸检测。(石家庄市疾病预防控制中心)